Trust.

Legal & Compliance information

TRUST PRIMO KEYBOARD AND MOUSE SET

23970-02 - US
23971-02 - IT
23972-02 - ES
23973-02 - DE
23974-02 - UK
23987-02 - BE
23995-02 - PT
23993-02 - FR
24344-02 - BG
24384-02 - HR/SI

Conformity information
Declaration of conformity/Declaration of performance is available at www.trust.com/product/conformity

Disposal of packaging materials

Disposal of the device

Disposal of batteries

UK
Conformity information
Declaration of conformity/Declaration of performance is available at www.trust.com/product/conformity
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 - RoHS
Regulations 2020
Declaration of conformity/Declaration of performance is available at www.trust.com/product/conformity

EN – GENERAL INFORMATION

Intended use
Declaration of Conformity (CE/UKCA/Conformity)
Hereby, Trust International B.V. declares that this product (TRIMO) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable directives.
Safety instructions
Keep the product dry, do not expose it to rain or moisture. Do not use the product in dusty environments. Do not dismantle the product or attempt to repair it. Use the product only for its intended purpose. Use only the cable provided with the product. Do not bend or twist the cable too much. Do not place the cable where it can be damaged by sharp edges or moving parts. Do not place the cable near heat sources. Do not place the cable near sources of electromagnetic interference. Do not place the cable near liquids. Do not place the cable near flammable materials. Do not place the cable near explosive materials. Do not place the cable near chemicals. Do not place the cable near medical devices. Do not place the cable near sharp objects. Do not place the cable near food or beverages. Do not place the cable near children or pets. Do not place the cable near open flames. Do not place the cable near hot surfaces. Do not place the cable near cooking appliances. Do not place the cable near electrical appliances. Do not place the cable near water. Do not place the cable near other cables. Do not place the cable near other equipment. Do not place the cable near other devices. Do not place the cable near other products. Do not place the cable near other items. Do not place the cable near other things. Do not place the cable near other objects. Do not place the cable near other substances. Do not place the cable near other materials. Do not place the cable near other chemicals. Do not place the cable near other medical devices. Do not place the cable near other sharp objects. Do not place the cable near other food or beverages. Do not place the cable near other children or pets. Do not place the cable near other open flames. Do not place the cable near other hot surfaces. Do not place the cable near other cooking appliances. Do not place the cable near other electrical appliances. Do not place the cable near other

Αντιαιμοπετάλια και παράγοντες αναστολής της πήξης

Αντιαιμοπετάλια και παράγοντες αναστολής της πήξης δεν θα πρέπει κατά κανόνα να χορηγούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εκτός εάν υπάρχει ένδειξη για αυτή τη θεραπεία.

Αναλγητικά

Η χρόνια χορήγηση παυσίπονων ναρκωτικών

Η χρόνια χορήγηση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια του τοκετού ή μετά τη γέννηση η νεογνό θα χρειαστεί κλινική φροντίδα. Η χορήγηση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί επίσης να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα στο νεογνό.

Η χρόνια χορήγηση παυσίπονων μη ναρκωτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας στη μητέρα, στο παιδί κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση παυσίπονων κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί επίσης να καθυστερήσει τη διαστολή του τραχήλου της μήτρας.

Αντιβιοτικά

Η χορήγηση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση αντιβιοτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Αντιδιαβητικά

Η χορήγηση αντιδιαβητικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση αντιδιαβητικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Αντιεπιληπτικά

Η χορήγηση αντιεπιληπτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση αντιεπιληπτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Αντιισταμινικά

Η χορήγηση αντιισταμινικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση αντιισταμινικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Αντιμυκητιασικά

Η χορήγηση αντιμυκητιασικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση αντιμυκητιασικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Αντιπηκτικά

Η χορήγηση αντιπηκτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση αντιπηκτικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Αντιψυχωσικά

Η χορήγηση αντιψυχωσικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση αντιψυχωσικών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Βιταμίνες-ανιχνευτές

Η χορήγηση βιταμινών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση βιταμινών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Γλυκοκορτικοειδή

Η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση γλυκοκορτικοειδών κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Δεξαμεθαζόνη

Η χορήγηση δεξαμεθαζόνης κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση δεξαμεθαζόνης κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

Δεξαμεθασόνη

Η χορήγηση δεξαμεθασόνης κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης στη μητέρα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η χορήγηση δεξαμεθασόνης κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων στο νεογνό.

**Δεξαμεθασόνη-ανιχνευτές