Trust.

Legal & Compliance information

TRUST TKM-250 KEYBOARD AND MOUSE SET

23975-02 - US
23977-02 - ES
23978-02 - DE
23979-02 - UK
24461-02 - ND

Conformity information
Declaration of Conformity and statement of conformity is available at www.trust.com/product/conformity

Disposal of packaging materials

Disposal of the device

Disposal of batteries

UK
Conformity information
Declaration of Conformity and statement of conformity is available at www.trust.com/product/conformity
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, RoHS

EU
Declaration of Conformity and statement of conformity is available at www.trust.com/product/conformity

EN – GENERAL INFORMATION

Intended use
This product is intended for consumer use only.

Declaration of Conformity
Hereby, Trust International B.V. declares that this product (TKM-250) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For more information, please visit www.trust.com/product/conformity

Safety instructions
- Do not expose the product to extreme temperatures (either cold or heat).
- Do not expose the product to open flames.
- Do not attempt to disassemble the product. Doing so will cause damage to the product and void the warranty.
- Do not allow the product to come into contact with the electronics of the device.
- Do not drop the product.
- Do not place the product in a damp or wet place, unless the product is rated for use in such an environment. Protect the product from moisture and liquids.
- Do not use the product for any purpose other than its intended use.
- Do not use the product if any part of it is damaged.
- Do not place the product near a heat source.
- Do not place the product near flammable materials.
- Do not place the product near magnetic fields.
- Do not place the product near sharp objects.
- Do not place the product on an unstable surface.
- Do not place the product near a pacemaker or other medical equipment.
- Do not place the product near a microwave oven.
- Keep out of the reach of children.
- Keep out of the reach of pets.
- Do not place the product near a wireless device.
- Do not place the product near a mobile phone.
- Do not place the product near a Bluetooth device.
- Do not place the product near a USB 3.0 port.
- Do not place the product near a USB-C port.
- Do not place the product near a USB-A port.
- Do not place the product near a USB port.
- Do not place the product near a USB hub.
- Do not place the product near a USB cable.
- Do not place the product near a USB-C cable.
- Do not place the product near a USB-A cable

Αντιαιμοπετάλια και παράγοντες αναστολής της πήξης

Αντιαιμοπετάλια και παράγοντες αναστολής της πήξης δεν θεωρούνται κατάλληλα φάρμακα για τη θεραπεία ή τη πρόληψη της ισχαιμικής καρδιοπάθειας σε ασθενείς χωρίς κλινικά σημεία θρομβοφιλίας ή σε ασθενείς χωρίς ενεργό αιμορραγία.

Ενεργός αιμορραγία

Η ενεργός αιμορραγία αποτελεί κλινικά σημαντικό πρόβλημα μετά τη χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων, ιδιαίτερα μετά τη χορήγηση συνδυασμένης αντιθρομβωτικής αγωγής. Η ενεργός αιμορραγία θα πρέπει κατά κανόνα να θεωρείται ένδειξη αναστολής της αντιθρομβωτικής αγωγής.

Χειρουργικές παρεμβάσεις

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Ηπατικές ανωμαλίες

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Ενδοκρινείς διαταραχές

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Γαστρεντερικές διαταραχές

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Ηλικιακές ομάδες

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Φυλετικές διαφορές

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Παρατεταμένη χορήγηση

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Υπερβολική δοσολογία

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Παραλείψεις δόσεων

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Φαρμακευτικές μορφές

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Τρόπος χορήγησης

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Χρόνος ημιζωής

Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων σε ασθενείς οι οποίοι υπόκεινται σε χειρουργικές παρεμβάσεις θα πρέπει κατά κανόνα να διακόπτεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη χειρουργική παρέμβαση. Η χορήγηση αντιθρομβωτικών φαρμάκων θεωρείται κατάλληλη μετά τη χειρουργική παρέμβαση εφόσον η κλινική κατάσταση του ασθενούς δεν υπαγορεύει κάτι διαφορετικό.

Δεν υπάρχουν δεδομένα.

Δεν υπάρχουν δεδομένα.

Δεν υπάρχουν δεδομένα.